

Lokelma reduserer kaliumnivået 1 time etter inntak¹

LOKELMA TIL BEHANDLING AV HYPERKALEMI HOS VOKSNE PASIENTER



RASK EFFEKT - Reduserer kalium 1 time etter inntak¹



UTEN SMAK - Kan inntas med eller uten mat



Kan administreres - på samme tid som andre legemidler²



Blandes i 45 ml væske (3 spiseskjeer) væske

KORREKSJONSFASE

Anbefalt startdose er:

10 g x 3 / dag*
til normokalemi er
oppnådd



VEDLIKEHOLDSFASE

Anbefalt startdose er:

5 g x 1 / dag*
med mulighet for
justering



KRONISK HEMODIALYSE

Anbefalt startdose er:

5 g x 1 / dag*
på dager uten dialyse



De vanligste bivirkningene er hypokalemi (4,1%) og ødemrelaterte hendelser (5,7%).

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Serumkaliumnivå bør monitoreres ved klinisk indikasjon også etter endring av legemidler som påvirker serumkalium-konsentrasjonen (eks. ved RAASi eller diuretika) og etter at Lokelma-dosen er titrert. Ved alvorlig hypokalemi skal Lokelma seponeres og pasienten revurderes. Bruk under graviditet bør unngås.

Referanser:

1. Lokelma SPC pkt 5.1 En statistisk signifikant reduksjon av serum-kalium på 14% ble observert en time etter første dose.
2. Lokelma SPC pkt 4.4, 4.5

* Ved glemt dose, bør neste dose tas til planlagt tid.

Lokelma (natriumzirkoniumsyklosilikat) – viktig informasjon

Indikasjon: Behandling av hyperkalemi hos voksne. **Dosering:** Korrigeringsfase: Anbefalt startdose er 10 g 3 ganger daglig. Når normokalemi er oppnådd bør vedlikeholdsdosering følges. Hvis normokalemi ikke oppnås etter 72 timer med behandling, bør andre behandlingsstrategier vurderes. Vedlikeholdsfasen: Når normokalemi er oppnådd, skal den laveste effektive dose fastsettes. Anbefalt startdose er 5 g 1 gang daglig. Ved behov kan dosen titreres opp til 10 g en gang daglig, eller ned til 5 g annenhver dag. Vedlikeholdsdosen bør ikke overskride 10g en gang daglig. Kronisk hemodialyse: Lokelma skal kun gis på dager uten dialyse. Anbefalt startdose er 5 g en gang daglig. For å etablere normokalemi kan dosen titreres ukentlig opp eller ned, basert på predialytisk serum-kaliumnivå etter et langt interdialytisk intervall/LIDI. Dosen kan justeres med en ukes intervall, i trinn på 5 g, opp til en dose på 15 g en gang daglig på dager uten dialyse. Det anbefales å overvåke serum-kaliumnivå ukentlig under dosejustering. **Administrering:** Doseposens innhold blandes med ca. 45 ml vann, og væsken drikkes mens den ennå er uklar. **Pris, pakning og forskrivningsregler:** 5 g 30 stk. (dosepose) 3264,20; 10 g 30 stk. (dosepose) 6492,10. Reseptgruppe C. H-resept. Lokelma inngår i RHF anbefalinger til vedlikeholdsbehandling av hyperkalemi hos pasienter med kronisk nyresvikt eller hjertesvikt og rekvirering skal gjøres i tråd med disse. **For fullstendig informasjon, les FK-tekst eller godkjent SPC på www.felleskatalogen.no for Lokelma.**

NO-13231-11-24-CVRM