

Lokelma reduserer kaliumnivået 1 time etter inntak og kan brukes i korreksjonsfase^{2^A}

OM LOKELMA (NATRIUMZIRKONIUMSYKLOSILIKAT)



RASK EFFEKT - REDUSERER KALIUMNIVÅET 1 TIME ETTER INNTAK^A



UTEN SMAK OG LUKT, KAN INNTAS MED ELLER UTEN MAT



KAN ADMINISTRERES PÅ SAMME TID SOM ANDRE LEGEMIDLER[#]



BLANDES I 45 ML (3 SPIESKJEER) VÆSKE

LOKELMA TIL BEHANDLING AV HYPERKALEMI HOS VOKSNE PASIENTER

KORREKSJONSFASE

Anbefalt startdose er:
10 g x 3 / dag*
til normokalemi er oppnådd



VEDLIKEHOLDSFASE

Anbefalt startdose er:
5 g x 1 / dag*
med mulighet for justering



KRONISK HEMODIALYSE

Anbefalt startdose er:
5 g x 1 / dag*
på dager uten dialyse



De vanligste bivirkningene er hypokalemi (4,1%) og ødemrelaterte hendelser (5,7%).

^A Placebokontrollert vedlikeholdsstudie som studerte 258 pasienter med hyperkalemi. Reduksjon i serum-kalium ble observert 1 time etter den første dosen på 10 g Lokelma. Median tid til normokalemi var 2,2 timer.²

[#] Natriumzirkoniumsyklosilikat bør administreres minst 2 timer før eller 2 timer etter orale legemidler med klinisk betydningsfull gastrisk pH-avhengig biotilgjengelighet som azolantymykotika, HIV-legemidler og tyrosinkinasehemmere.³

* Ved glemt dose, bør neste dose tas til planlagt tid.

Referanser: 1. <https://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/Kronisk%20nyresykdom/Kronisk-nyresykdom.pdf> 2. Lokelma godkjent SPC pkt 5.1 3. Lokelma godkjent SPC pkt 4.4, 4.5

LOKELMA (NATRIUMZIRKONIUMSYKLOSILIKAT) – VIKTIG INFORMASJON

Indikasjon: Behandling av hyperkalemi hos voksne.

Dosering: Korreksjonsfase: Anbefalt startdose er 10 g 3 ganger daglig. Når normokalemi er oppnådd bør vedlikeholdsdosering følges. Hvis normokalemi ikke oppnås etter 72 timer med behandling, bør andre behandlingsstrategier vurderes.

Vedlikeholdsfasen: Når normokalemi er oppnådd, skal den laveste effektive dose fastsettes. Anbefalt startdose 5 g 1 gang daglig. Ved behov kan dosen titreres opp til 10 g en gang daglig, eller ned til 5 g annenhver dag. Vedlikeholdsdosen bør ikke overskride 10g en gang daglig.

Kronisk hemodialyse: Lokelma skal kun gis på dager uten dialyse. Anbefalt startdose er 5 g en gang daglig. For å etablere normokalemi kan dosen titreres ukentlig opp eller ned, basert på predialytisk serum-kaliumnivå etter et langt interdialytisk intervall/LIDI. Dosen kan justeres med en ukes intervall, i trinn på 5 g, opp til en dose på 15 g en gang daglig på dager uten dialyse. Det anbefales å overvåke serum-kaliumnivå ukentlig under dosejustering. **Administrering:** Doseposens innhold blandes med ca. 45 ml vann, og væsken drikkes mens den ennå er uklar.

Refusjon: H-resept

Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Lokelma inngår i RHF anbefalinger til vedlikeholdsbehandling av hyperkalemi hos pasienter med kronisk nyresvikt eller hjertesvikt.

For legemidlene under skal denne rangeringen legges til grunn for de ulike doseringene:

1. valg: Natriumzirkoniumsyklosilikat (Lokelma, AZ) 5 g daglig / 10 g daglig

2. valg: Patiromersorbitekskalsium (Veltassa, Vifor) 8,4 g daglig / 16,8 g daglig

Der det foreligger en rangering, skal førstevalg benyttes i oppstart og medisinsk begrunnet endring av behandling. Vedtaket gjelder i perioden 01.01.2024 - 31.05.2026.

Pakninger og priser: 5 g 30 stk. (dosepose) 3264,20; 10 g 30 stk. (dosepose) 6492,10.

Reseptgruppe C.

For fullstendig informasjon, les FK-tekst eller godkjent SPC på www.felleskatalogen.no for Lokelma. NO-11602-12-23-CVRM