

QUICK-GUIDE VANLIGE DIABETES TYPE 2 LEGEMIDLER

Se felleskatalogen for preparatomtale og dosering for alle produkter inkludert spesielle pasientgrupper - www.felleskatalogen.no


Handelsnavn	Virkestoff	Generell dosering*	Formulering
BIGUANIDER			
Glucophage	metformin	500-1000 mg x 1-3	tablett
Metformin	metformin	500-1000 mg x 1-3	tablett
SGLT2-HEMMERE (NATRIUMGLUKOSE KOTRANSPORTØR 2 HEMMERE)			
Forxiga	dapagliflozin	10 mg x 1	tablett
Jardiance	empagliflozin	10-25 mg x 1	tablett
Invokana	kanagliflozin	100-300 mg x 1	tablett
SGLT2-HEMMER KOMBINASJON MED METFORMIN			
Xigduo	dapagliflozin + metformin	5/850-1000 mg x 2	tablett
Synjardy	empagliflozin + metformin	5-12,5/850-1000 mg x 2	tablett
SGLT2-HEMMER KOMBINASJON MED DPP-4-HEMMER			
Qtern	saxagliptin + dapagliflozin	5/10 mg x 1	tablett
Glyxambi	linagliptin + empagliflozin	5/10-25 mg x 1	tablett
DPP-4-HEMMER TIDYL PEPTIDASE 4 HEMMERE)			
Januvia	sitagliptin	100 mg x 1	tablett
Galvus	vildagliptin	50 mg x 2	tablett
Onglyza	Saxagliptin	2,5-5 mg x 1	tablett
Trajenta	linagliptin	5 mg x 1	tablett
DPP-4-HEMMER INASJON MED METFORMIN			
Janumet	sitagliptin + metformin	50/850-1000 mg x 2	tablett
Eucreas	vildagliptin + metformin	50/850-1000 mg x 2	tablett
Jentadueto	linagliptin + metformin	2.5/850-1000 mg x 2	tablett
SU (SULFONYLUREA)			
Glimepirid	glimepirid	1-4 mg x 1	tablett


Handelsnavn	Virkestoff	Generell dosering*	Formulering
TZD (TIAZOLIDINDIONER)			
Actos	pioglitazon	15-45 mg x 1	tablett
Pioglitazone	pioglitazon	15-45 mg x 1	tablett
GLINIDER			
Novonorm	repaglinid	0.5-4 mg x 1-3	s.c.injeksjon
Repaglinide	repaglinid	0.5-4 mg x 1-3	s.c.injeksjon
GLP-1-ANALOG (GLUKAGONLIGNENDE PEPTID- 1 RESEPTORAGONIST)			
Victoza	liraglutid	0,6-1,8 mg x 1	s.c.injeksjon
Ozempic	semaglutide	0,25-1 mg x 1/uke	s.c.injeksjon
Rybelsus	semaglutid	3-14 mg x 1	s.c.injeksjon
Trulicity	dulaglutid	0,75-1,5 mg/uke	s.c.injeksjon
ANDRE BLODGLULOSESENKENDE MIDLER			
Mounjaro	tirzepatid	2,5-15mg x 1/uke	s.c.injeksjon
GLP-1-RESEPTORAGONIST KOMBINASJON MED INSULIN			
Xultophy	insulin degludec og liraglutid	10-50 dosetrinn/dag	s.c.injeksjon
BASALINSULINER			
Humulin NPH	isophan human insulin	individuell, oftest 0.3-1 E/kg	s.c.injeksjon
Insulatard	isophan human insulin	individuell, oftest 0.3-1 E/kg	s.c.injeksjon
Lantus	insulin glargin	individuell, oftest 0.3-1 E/kg	s.c.injeksjon
Toujeo	insulin glargin	individuell, oftest 0.3-1 E/kg	s.c.injeksjon
Abasaglar	insulin glargin	individuell, oftest 0.3-1 E/kg	s.c.injeksjon
Tresiba	insulin degludec	individuell, oftest 0.3-1 E/kg	s.c.injeksjon
Levemir	insulin detemir	individuell, oftest 0.3-1 E/kg	s.c.injeksjon
Listen for insulin er ikke uttømmende.			



Vil du motta informasjon om våre møter og medisinske nyheter?

Registrer deg her ved å peke kamera på telefonen din mot QR-koden.






FLYTDDIAGRAM NORSK FAGLIG RETNINGSLINJE FOR TYPE 2 DIABETES




Last ned
HER



OPPDATERT VEILEDER OM KRONISK NYRESYKDOM FOR ALLMENNLEGER!



Last ned
HER



OPPDATERT HJERTESVIKTVEILEDER FOR ALLMENNLEGER!



Last ned
HER

VIKTIG INFORMASJON

Forxiga (dapagliflozin) 10 mg

Indikasjoner: Forxiga er indisert til behandling av utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 (T2D) hos voksne og barn ≥ 10 år, som tillegg til diett og fysisk aktivitet: Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse eller som tillegg til andre legemidler til behandling av T2D. Behandling av kronisk nyresykdom hos voksne. Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt hos voksne. **Anbefalt dosering:** Forxiga 10 mg 1 gang daglig. **Bivirkninger:** Svært vanlige: Hypoglykemi (når brukt med sulfonyleurea (SU) eller insulin). Vurder en lavere dose av insulin/ SU for å redusere denne risikoen ved T2D. Vanlige: Genitale infeksjoner, urinveisinfeksjoner. **Forsiktighetsregler:** Forxiga 10 mg skal ikke brukes ved T1D, hos gravide eller ammende. Brukes med forsiktighet hos pasienter med økt risiko for diabetisk ketoacidose. **Refusjonsberettiget bruk:** Behandling av pasienter med kronisk nyresykdom med bekreftet albuminuri (eGFR 25–<90 mL/min/1.73m² og albumin/kreatinin-ratio i urin over 20 mg/mmol). **Refusjonskoder: ICPC:** U99 Nyresvikt kronisk. **ICD:** N18 Kronisk nyresykdom. **Vilkår 260:** Refusjon ytes kun i kombinasjon med optimalisert behandling med RAAS-hemmer, enten ved bruk av ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorblokker (ARB). Som tillegg til annen blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2 (unntatt GLP-1-analoger). **Refusjonskoder: ICPC:** T90 Diabetes type 2. **ICD: E11** Diabetes mellitus type 2. **Vilkår 264:** Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår glykemisk kontroll på behandling med metformin. Pasienter med etablert hjerte- og karsykdom og/eller nyresykdom kan starte med SGLT2 hemmer i kombinasjon med metformin som førstevalg. Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt hos voksne. **Refusjonskoder: ICPC:** K77 Hjertesvikt. **ICD:** I50 Hjertesvikt. **Reseptgruppe C. Pakninger og priser: 10 mg:** 28 stk. kr 450. 98 stk. kr 1432,30

Xigduo (5 mg dapagliflozin og 850 mg metforminhydroklorid, resp 1000 mg)

Indikasjoner: Xigduo er indisert til voksne for behandling av diabetes mellitus type 2, som et supplement til diett og fysisk aktivitet hos pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med den maksimalt tolererte dosen av metformin alene. I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes hos pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med metformin og disse legemidlene. Hos pasienter som allerede blir behandlet med kombinasjonen av dapagliflozin og metformin som separate tabletter. For resultater fra studier med henblikk på kombinasjonsbehandlinger, effekter på glykemisk kontroll og kardiovaskulære hendelser samt undersøkte populasjoner, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1. **Anbefalt dosering: Xigduo 5 mg/850 mg 5 mg/1000 mg 1 x 2 ganger daglig. Bivirkninger:** Svært vanlige: Hypoglykemi (når brukt med SU eller insulin). Gastrointestinale symptomer. Vanlige: Vulvovaginit, balanitt og relaterte genitale infeksjoner. Infeksjoner i urinveiene Vitamin B12-reduksjon/ mangel, smaks-forstyrrelser, svimmelhet, utslett, ryggsmerte, dysuri, polyuri, Økt hematokrit-verdi, nedsatt renal kreatinin-clearance ved behandlings-start, dyslipidemi. **Kontraindikasjoner:** Akutt metabolsk acidose (som laktacidose, diabetisk ketoacidose), diabetisk pre-koma, alvorlig nyresvikt (GFR < 30 mL/min), akutte tilstander med potensiale til å forandre nyrefunksjonen, slik som: dehydrering, alvorlig infeksjon, sjokk. Akutt eller kronisk sykdom som kan forårsake vevshypoksi, slik som: hjerte- eller lungesvikt, nylig hjerteinfarkt, sjokk, nedsatt leverfunksjon, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme). **Forsiktighetsregler:** Laktacidose: Laktacidose forekommer oftest ved akutt forverring av nyrefunksjonen eller ved kardiorespiratorisk sykdom eller sepsis. Metforminakkumulering oppstår ved akutt forverring av nyrefunksjonen, og dette øker risikoen for laktacidose. **Refusjonsberettiget bruk:** Som tillegg til annen blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2 (unntatt GLP-1-analoger). **ICPC:** T90 Diabetes type 2 **ICD:** E11 Diabetes mellitus type 2. **Vilkår 265:** Refusjon ytes til pasienter som ikke oppnår glykemisk kontroll på behandling med metformin. Pasienter med etablert hjerte- og karsykdom og/eller nyresykdom kan starte med SGLT2 hemmer i kombinasjon med metformin som førstevalg. **Reseptgruppe C. Pakninger og priser: 5 mg/850 mg** 196 stk. kr 1769,10 **5 mg/1000 mg** 56 stk. kr 537,6

Qtern (saxagliptin/dapagliflozin)

Indikasjoner: Qtern (fast kombinasjon av saxagliptin og dapagliflozin) er indisert til voksne i alderen 18 år og eldre med diabetes mellitus type 2: For å bedre glykemisk kontroll når metformin og/eller sulfonyleurea (SU) og en av monokomponentene i Qtern ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Når pasienten allerede er behandlet med fri kombinasjon av dapagliflozin og saxagliptin. **Anbefalt dosering:** én tablett med 5 mg saxagliptin/10 mg dapagliflozin én gang daglig. **Bivirkninger: Svært vanlige:** Øvre luftveisinfeksjon, hypoglykemi (når brukt med SU) **Vanlige:** Urinveisinfeksjon, vulvovaginit, balanitt og relaterte genitale infeksjoner. Gastroenteritt, dyslipidemi, hodepine og svimmelhet. Magesmerter, diaré, dyspepsi, gastritt, kvalme og oppkast. Dysuri, polyuria og utslett. Artralgi, ryggsmerte, myalgi, fatigue og perifert ødem. Nedsatt renal kreatininclearance og økt hematokrit. **Forsiktighetsregler:** Akutt pankreatitt: Bruk av DPP-4-hemmere er assosiert med risiko for akutt pankreatitt. Pasienten bør informeres om symptomene på dette: Vedvarende, kraftige magesmerter. Ved mistanke om pankreatitt skal preparatet seponeres. **Refusjonsberettiget bruk:** Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler i tråd med godkjent preparatomtale. **ICPC:** T90 Diabetes type 2 **ICD:** E11 Diabetes mellitus type 2 **Vilkår 232:** Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. **Reseptgruppe C. Pakninger og priser: 5 mg/10 mg:** 98 stk. kr 2547,10

Onglyza (saxagliptin)

Indikasjoner: Onglyza er indisert til voksne pasienter med diabetes mellitus type 2 som et supplement til diett og fysisk aktivitet for å bedre glykemisk kontroll: som monoterapi hvor metformin er uhensiktsmessig på grunn av intoleranse eller kontraindikasjoner. I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes, inkludert insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll. **Anbefalt dosering:** Anbefalt dose Onglyza er 5 mg én gang daglig **Bivirkninger:** Vanlige: Infeksjoner og parasittære sykdommer: Øvre luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, gastroenteritt, sinusitt, nasofaryngitt. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet Gastrointestinale: Magesmerter, diaré, kvalme, oppkast. Hud- og underhudssykdommer: Utslett. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjons-stedet: Tretthet. **Forsiktighetsregler:** Skal ikke brukes av pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. **Refusjonsberettiget bruk:** Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonyleurea. Insulinbehandling må være vurdert som et alternativ for oppstart. Refusjonskoder: **ICPC:** T90 Diabetes type 2 **ICD:** E11 Diabetes mellitus type 2 **Vilkår 232:** Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. **Reseptgruppe C. Pakninger og priser: 5 mg** 98 stk. kr 1388,10