



Information om eosinofil astma och behandling med **Fasenra® (benralizumab).** **Förfylld injektionspenna**

Patientinformation till dig som har
ordinerats behandling med Fasenra®

**Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel.
Den innehåller information som är viktig för dig.**



Ges till patienter som har ordinerats Fasenra®.
Den här broschyren tillhandahålls av AstraZeneca.

SE-20668-11-25-FA

Du har fått diagnosen eosinofil astma

Ditt blodprov visar att du har en form av astma som orsakas av en särskild sorts immunceller i blodet. Cellerna kallas eosinofiler.



Eosinofiler är en naturlig del av immunsystemet.



De är en typ av vita blodkroppar som i vanliga fall hjälper till att skydda mot infektioner.



Eosinofil astma innebär att du har för många eosinofiler i ditt blod eller i dina lungor.



Det kan orsaka en inflammation i lungorna och förvärra dina astmasymtom.

Därför har du ordinerats Fasenra®

Fasenra® är avsett för vuxna med svår eosinofil astma.

Används tillsammans med dina andra astmabehandlingar.

Målet för Fasenra® är ett protein som kallas interleukin-5-receptor, vilken särskilt återfinns på en typ av vit blodkropp som kallas eosinofil.

Fasenra® börjar verka efter första dosen, och du kan märka att din andning blir bättre.



Fasenra® binder till eosinofiler i ditt blod och dina lungor, och hjälper din kropp att förstöra dem.



Det kan göra det lättare att andas och hjälpa till att förebygga astmaattacker.



Med tiden kan medicinen även ge dig möjlighet att minska eller avsluta intaget av orala kortikosteroider (om du använder sådana).

Informera din läkare

Saker du kan ta upp vid läkarbesöket:



Din andning

Särskilt om du hostar eller har pipande andning.



Dagliga aktiviteter som du inte har kunnat utföra

Till exempel att gå och handla eller delta i familjeaktiviteter.



Dina astmaattacker

Har du haft några, och hur allvarliga har de varit?



Sömn

Särskilt om du har astma som hindrar dig från att sova ordentligt.



Användning av medicin

Särskilt användning av inhalator och steroider.



Amning

Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkare.




Biverkningar

Sök genast läkarvård om du tror att du kan ha fått en allergisk reaktion. Sådana reaktioner kan uppträda inom några timmar eller dagar efter injektionen. Symtomen är vanligtvis: svullnad av ansikte, tunga eller mun, andningssvårigheter, svimning, yrsel, svimningskänsla (på grund av blodtrycksfall). Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är huvudvärk, faryngit (ont i halsen), feber, reaktion på injektionsstället (till exempel smärta, rodnad, klåda, svullnad nära det ställe där injektionen gavs).

Använd din personliga behandlingsplan

Har du fått din personliga vårdplan av din läkare eller sjuksköterska?

Fyll i den tillsammans med din läkare eller sjuksköterska. Fortsätt därefter att använda den hemma. Kom ihåg att ta med den till dina läkarbesök.



Behandling med Fasenra® kan skilja sig från det du är van vid...



Fasenra® 30 mg injektionsvätska i förfylld spruta eller injektionspenna
Behandling med Fasenra® ges som en injektion. Du kommer fortfarande att behöva din inhalator/dina inhalatorer som du har ordinerats av din läkare.



Fasenra® innehåller den aktiva substansen benralizumab,
vilket är en monoklonal antikropp, d.v.s. en typ av protein som känner igen och fastnar på en specifik målsubstans i kroppen.



Du ska inte använda Fasenra® om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot en injektion eller ett läkemedel
Fasenra® ska inte användas om du har en parasitinfektion eller om du bor i eller rest till ett område där det är vanligt. Som en försiktighetsåtgärd bör användning av Fasenra® undvikas under graviditet.



Du kommer få 6 till 8 injektioner om året
Under de tre första månaderna doseras Fasenra® var 4:e vecka, därefter varannan månad.

Det här är vad du kan förvänta dig:



Du kommer att få lämna ett blodprov.



Injektionen ges av din läkare, sjuksköterska eller av dig själv om överenskommet.



Injektionen ges i låret eller buken. Om sjukvårdspersonal injicerar kan den ges i överarmen.



Du får kanske sitta kvar och vila en stund efter injektionen.




Du kommer få berätta hur du mår och hur du upplever din nya behandling med Fasenra®.

Ditt injektionsschema

Om inte din läkare har sagt något annat:

- Dina tre första injektioner ges med fyra veckors mellanrum.
- Därefter ges de var åttonde vecka.
- Det innebär att du under det första året får åtta injektioner och därefter får du sex injektioner om året.
- Varje injektion ges med en förfylld injektionspenna.



Fasenra® kan administreras antingen på sjukhus eller annan läkarmottagning eller av dig själv om det bedöms lämpligt.



Prata med din läkare om vilket alternativ som är mest meningsfullt för din behandling med Fasenra®.



Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

Fasenra® ges som en injektion precis under huden (subkutant). Du och din läkare eller sjuksköterska ska avgöra om du kan injicera Fasenra® själv. Du ska inte själv injicera Fasenra® om du inte tidigare behandlats med Fasenra® eller om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot Fasenra®.


Innan du använder Fasenra® förfylld injektionspenna ska din läkare eller sjuksköterska visa hur du använder den på rätt sätt.

Bruksanvisning för

Fasenra Pen® (benralizumab)


Innan du använder din Fasenra Pen ska din läkare visa dig eller din vårdare hur man använder den på rätt sätt. **Läs den fullständiga Bruksanvisningen som finns i Bipacksedeln innan du börjar använda din Fasenra Pen och varje gång du får en ny förpackning.** Informationen kan ha uppdaterats. Denna information ersätter inte samtalen med din läkare om din sjukdom eller din behandling. Om du eller din vårdare har några frågor, tala med din läkare.

Ta inte av nålskyddet förrän du har kommit till steg 6 i dessa instruktioner och är redo att injicera Fasenra.



Steg 1 – Ta fram material

- 1 Fasenra Pen från kylskåpet
- 1 sprittork
- 1 bomullstuss eller kompress
- 1 avfallsbehållare för stickande föremål.
- (Se steg 10 – Kasta den använda Fasenra Pen på ett säkert sätt)






Steg 2 – Förbered dig för att använda din Fasenra Pen

Kontrollera utgångsdatumet (EXP). Använd den inte om utgångsdatumet har passerat. **Låt den förfyllda injektionspennan anta rumstemperatur, mellan 20 °C och 25 °C, genom att lämna kartongen utanför kylskåpet i cirka 30 minuter före administrering.**

Värm inte Fasenra Pen på något annat sätt, till exempel i en mikrovågsugn eller i varmt vatten och placera den inte nära andra värmekällor.

Efter att Fasenra tagits ut från kylskåpet måste den användas inom 14 dagar.

Ta inte av locket förrän du har kommit till steg 6.




Steg 3 – Kontrollera vätskan

Titta på vätskan i Fasenra Pen genom inspektionsfönstret.

Vätskan ska vara klar och färglös till gul. Den kan innehålla små vita partiklar.

Injicera inte Fasenra om vätskan är grumlig, missfärgad eller om den innehåller stora partiklar. Du kan se en liten luftbubbla i vätskan. Detta är normalt. Du behöver inte göra något åt det.



Steg 4 – Välj injektionsställe


Det rekommenderade injektionsstället är på framsidan av låret. Du kan också använda den nedre delen av din mage.

Injicera inte:

- inom 5 cm från naveln
- där huden är öm, har blåmärken, är fjällande eller har förhårdnader
- där huden har ärr eller är skadad
- genom kläder

En vårdare kan injicera dig på överarmen, låret eller magen.

Försök inte injicera dig själv i armen. För varje injektion, välj ett nytt ställe som är minst 3 cm från det förra injektionsstället.




Steg 5 – Rengör injektionsstället

Tvätta dina händer noga med tvål och vatten. Torka av injektionsstället med en sprittork i en cirkelrörelse. Låt det lufttorka.

Ta inte på det rengjorda området före injicering.

Fläkta eller blås inte på det rengjorda området.



Steg 6 – Dra av locket

Håll Fasenra Pen med en hand och dra försiktigt av locket rakt ut med den andra handen.

Lägg undan locket för att kasta senare.

Det gröna nålskyddet är nu fritt. Det finns där för att förhindra att du rör nålen.

Försök inte röra vid nålen och tryck inte på nålskyddet med dina fingrar.

Försök inte sätta tillbaka locket på Fasenra Pen. Det kan medföra att injektionen inträffar för tidigt eller att nålen skadas.

Genomför följande steg direkt efter att du tagit av locket.


Steg 7 – Injicera Fasenra

Följ läkarens instruktioner om hur du ska injicera. Du kan antingen försiktigt nypa huden på injektionsstället eller injicera utan att nypa huden.

Injicera Fasenra genom att följa stegen i figurerna **a**, **b**, **c** och **d**.


Håll Fasenra Pen på plats genom hela injektionen.

Byt inte position på Fasenra Pen efter att injektionen har startat.




Placera Fasenra Pen på injektionsstället.

Placera nålskyddet på Fasenra Pen platt mot din hud (90 graders vinkel). Säkerställ att du kan se inspektionsfönstret.




Tryck ner ordentligt.

Du hör ett klick. Ett **"klick"** talar om att injektionen har börjat. Den gröna kolven rör sig nedåt i inspektionsfönstret under injektionen.




Håll fast i 15 sekunder.

Du hör ett andra **"klick"**. Det andra klicket talar om att injektionen är klar. Den gröna kolven fyller inspektionsfönstret.



Lyft Fasenra Pen rakt upp.

Nålskyddet glider ner och låses på plats över nålen.




Steg 8 – Kontrollera inspektionsfönstret


Kontrollera inspektionsfönstret för att säkerställa att all vätska har injicerats.

Om den gröna kolven inte fyller inspektionsfönstret kanske du inte har fått full dos. Om detta händer eller om du har några andra frågor, kontakta din läkare.

Före injektion



Efter injektion



Steg 9 – Kontrollera injektionsstället

Det kan finnas en liten mängd blod eller vätska på injektionsstället. Detta är normalt.

Tryck försiktigt en bomullstuss eller kompress på huden tills blödningsen har slutat.

Gnugga inte injektionsstället.

Täck injektionsstället med ett litet plåster vid behov.



Steg 10 – Kasta den använda Fasenra Pen på ett säkert sätt

- Varje Fasenra Pen innehåller en dos Fasenra och **kan inte användas igen**.
- Lagg din använda Fasenra Pen i en **avfallsbehållare** för stickande föremål direkt efter användning.

Kasta inte Fasenra Pen i hushållsavfallet.

Kasta locket och annat material i hushållsavfallet.

Riktlinjer för kassering

Kasta den fulla avfallsbehållaren enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

Avfallsbehållaren **ska inte återvinnas**.



**För mer information, vänligen kontakta
AstraZeneca medicinsk information på:**

AZNordic@astrazeneca.com eller på
tlf. 08 553 260 00 (mån - fre: 08.00-16.30)

Det är naturligt att det uppstår frågor när man påbörjar en ny behandling.
Förhoppningsvis innehåller denna broschyr svaren på de flesta av dem.



Saknar du någon information?

Du hittar mer i förpackningens bipacksedel och i patientbroschyren.
Fråga alltid din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på något.



<https://www.medicininstruktioner.se/astrazeneca/fasenra/>

AstraZeneca AB

Forskaren Hagaplan 4

113 68 Stockholm

astrazeneca.se

