



TILL DIG SOM HAR ORDINERATS **IMFINZI** FÖR **ICKE-SMÅCELLIG LUNGCANCER**

Denna broschyr är avsedd för dig som har ordinerats IMFINZI vid en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer.

Läs noga genom bipacksedeln innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. IMFINZI bipacksedel finns på www.fass.se.

INNEHÅLLSFORTECKNING

VAD ÄR IMFINZI OCH VAD ANVÄNDS DET TILL? 4

Hur ges IMFINZI?5

Graviditet.....5

Amning.....5

Körförmåga och användning av maskiner.....5

Förstå biverkningar7

Vad gör jag om jag får en biverkning?7

Vanliga biverkningar vid behandling med IMFINZI 8

TECKEN OCH SYMTOM PÅ EVENTUELLA

ALLVARLIGA BIVERKNINGAR.....9

VANLIGA FRÅGOR.....12

Vad ska min läkare känna till innan jag påbörjar
behandling med IMFINZI? 12

Hur länge kommer jag att behandlas med IMFINZI? ... 13

Finns det någon stödgrupp att vända sig till?..... 13

Rapportering av biverkningar 13

DITT VÅRDTEAM 14

VIKTIGA ANTECKNINGAR15

VAD ÄR IMFINZI OCH VAD ANVÄNDS DET TILL?

Immunterapi vid cancer fungerar på ett annat sätt än cellgiftsbehandling. Medan cellgiftsbehandling angriper alla celler i kroppen som växer och delar sig snabbt - vilket cancerceller gör men även friska celler i exempelvis hårfolliklar, tarmar och benmärg - är immunterapi en mer riktad behandling som hjälper ditt immunförsvar att bekämpa just cancerceller.

IMFINZI är en cancerimmunterapi som innehåller den aktiva substansen durvalumab. Durvalumab är en antikropp som binder till ett specifikt målämne, vilket hjälper kroppens eget immunsystem att känna igen och bekämpa cancercellerna.

IMFINZI används bland annat för att behandla den typ av lungcancer som benämns icke-småcellig lungcancer (NSCLC), hos vuxna.

Beroende på i vilket stadium din NSCLC är, och om den kan opereras eller inte, kan du få IMFINZI antingen som enda läkemedel eller i kombination med annan behandling.

Du kan få IMFINZI i kombination med platinabaserad cellgiftsbehandling, före operation (neoadjuvant behandling) och som enda läkemedel efter operation (adjuvant behandling) om din NSCLC har spridit sig i lungan och kan avlägsnas med operation.

Du kan få IMFINZI som enda läkemedel om din NSCLC har spritt sig i lungan och inte kan opereras, och om sjukdomen har svarat på eller stabiliserats efter behandling med cellgift och strålning.

Du kan få IMFINZI i kombination med annan målriktad behandling och cellgift om din NSCLC har spritt sig i båda lungorna (och/eller till andra delar av kroppen), och inte kan opereras, och inte har förändringar (mutationer) i generna för EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor) eller ALK (anaplastiskt lymfomkinas).

IMFINZI används också som behandling vid flera andra cancerformer.

Om du har frågor om hur IMFINZI verkar eller varför du har blivit ordinerad detta läkemedel, kontakta din läkare.

Hur ges IMFINZI?

IMFINZI ges som en infusion i en ven i armen en gång varannan vecka alternativt en gång var fjärde vecka. Varje infusion tar cirka en timme.

Du ges IMFINZI på sjukhus eller på en mottagning under överinseende av en erfaren läkare. Din läkare kommer att bestämma hur många IMFINZI-behandlingar du behöver.

Graviditet

IMFINZI rekommenderas inte under graviditet.

Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Om du skulle kunna bli gravid, måste du använda effektivt preventivmedel medan du behandlas med IMFINZI och i minst 3 månader efter din sista dos.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar.

Fråga din läkare om du kan amma under eller efter behandling med IMFINZI.

Det är inte känt om IMFINZI går över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att IMFINZI skulle påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du får biverkningar som påverkar din koncentrations- och reaktionsförmåga, bör du emellertid vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner.



Förstå biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan IMFINZI orsaka biverkningar, men alla kommer inte att få biverkningar från IMFINZI. Om du får biverkningar ska du prata med ditt vårdteam. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i den här broschyren eller i bipacksedeln. Du ska vara uppmärksam på biverkningar såväl under som efter din behandling.

Här följer några tips som kan hjälpa dig:



Håll koll på hur du vanligtvis känner dig

Det är möjligt att du redan känner av symtom från din cancer, tidigare behandlingar eller andra läkemedel, så det är viktigt att skriva ned hur du känner dig före behandlingen. Detta kommer att hjälpa dig att lägga märke till eventuella förändringar.



Rapportera omedelbart biverkningar till din läkare

Om en biverkning identifieras tidigt kan den hanteras innan den blir allvarigare riskerar orsaka att behandlingen stoppas. Be ditt vårdteam hjälpa dig att identifiera och rapportera eventuella biverkningar som du upplever.



Samarbeta med din läkare

Det är viktigt att du låter ditt vårdteam få reda på eventuella biverkningar. Prata med dem om hur du känner dig just nu, om nya tecken på biverkningar eller någon annan förändring. Att få medicinsk behandling i tidigt skede kan förhindra att problemet blir allvarligt.

Vad gör jag om jag får en biverkning?

Om du får en biverkning, inklusive en som kanske inte nämns i denna broschyr eller i bipacksedeln, ska du genast kontakta ditt vårdteam. Det är lättare för ditt vårdteam att hantera biverkningar när de upptäckts tidigt.

Din läkare kan ge dig andra läkemedel för att förhindra allvarigare problem och för att hjälpa till att minska dina symtom. Eller så kanske din läkare bedömer att du ska vänta med eller hoppa över nästa dos av IMFINZI eller avsluta din behandling.

Vanliga biverkningar vid behandling med IMFINZI

Precis som alla andra läkemedel kan IMFINZI orsaka biverkningar, men alla kommer inte att få biverkningar från IMFINZI. Om du får biverkningar ska du prata med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns nedan eller i bipacksedeln.

Biverkningarna som listas nedan har rapporterats i kliniska studier med patienter som endast fick IMFINZI. Information om biverkningar som rapporterats i kliniska studier där patienter fick IMFINZI tillsammans med andra läkemedel finns i bipacksedeln

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

- infektioner i övre luftvägarna
- underaktiv sköldkörtel vilket kan ge upphov till trötthet eller viktökning
- hosta
- diarré
- magsmärta
- hudutslag eller klåda
- feber
- ledsmärta (atralgi)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- allvarliga lunginfektioner (pneumoni)
- svampinfektion i munnen
- infektion i tänder eller i mjukdelar i munnen
- influensaliknande sjukdom
- överaktiv sköldkörtel vilket kan ge upphov till hjärtklappning eller viktnedgång
- inflammation i lungorna (pneumonit)
- heshet (dysfoni)
- avvikande levertester (förhöjt aspartataminotransferas; förhöjt alaninaminotransferas)
- nattliga svettningar
- muskelsmärta (myalgi)
- avvikande njurfunktionstester (förhöjt blodkreatinin)
- smärta vid urinering (dysuri)
- svullnad i benen (perifer ödem)
- reaktion på infusion av läkemedlet vilket kan ge upphov till feber eller rodnad
- inflammation i levern vilket kan ge upphov till illamående eller minskad aptit

TECKEN OCH SYMTOM PÅ EVENTUELLA ALLVARLIGA BIVERKNINGAR

Biverkningar av behandling med immunterapi kan vara annorlunda jämfört med biverkningar som du kanske har upplevt vid tidigare behandlingar, och de kan ibland vara allvarliga. Därför är det viktigt att du känner dem, och att du känner till dem, och vilka tecken eller symptom du behöver vara uppmärksam på.

Informationen som ges här ersätter inte bipacksedeln, som innehåller information om andra möjliga biverkningar som inte nämns här.

Vissa symtom kan vara tecken på inflammation, eller andra tillstånd, som behöver hanteras av läkare. Kontakta därför genast din läkare om du upplever något av nedanstående symtom.



Inflammation i lungorna

- ny eller förvärrad hosta
- andfåddhet
- bröstsmärta



Inflammation i levern

- illamående eller kräkningar
- minskad aptit
- smärta i högra sidan av magen
- gul hud eller gula ögonvitor
- dåsighet
- mörk urin
- får blödning eller blåmärken lättare än normalt



Inflammation i tarmar

- diarré eller fler tarmtömningar än vanligt
- avföring som är svart, tjärliknande eller klibbig med blod eller slem
- svår magsmärta eller ömhet
- hål i tarmen



Inflammation i körtlar (särskilt sköldkörtel, binjurar, hypofys och bukspottkörtel)

- hjärtklappning
- extrem trötthet
- viktökning eller viktninskning
- yrsel eller svimning
- håravfall
- frusenhet
- förstoppning
- huvudvärk som inte går över eller onormal huvudvärk
- magsmärtor, illamående och kräkningar



Typ 1-diabetes

- högt blodsocker
- ökad hunger eller törst
- urinering oftare än vanligt
- snabb och djup andning
- förvirring
- söttaktigt luktande andedräkt
- en söt eller metallisk smak i munnen
- urin eller svett som luktar annorlunda



Inflammation i njurarna

- minskad mängd urin



Inflammation i huden

- utslag
- klåda
- blåsor i huden eller sår i munnen eller i andra fuktiga områden



Inflammation i hjärtmuskeln

- bröstsmärta
- andfåddhet
- oregelbundna hjärtslag



Inflammation i eller problem med musklerna

- muskelsmärta
- svaghet
- musklerna blir snabbt uttröttade



Inflammation i ryggmärgen (transversell myelit)

- smärta, domningar, stickningar eller svaghet i armar eller ben
- problem med urinblåsan eller tarmarna (däribland ett behov av att kissa oftare än vanligt, urininkontinens, svårigheter att kissa, förstoppning)



Infusionsrelaterade reaktioner

- frossa eller skakningar
- klåda eller utslag
- rodnande
- andfåddhet eller väsande andning
- yrsel
- feber



Inflammation i hjärnan (encefalit) eller i hinnorna runt ryggmärgen och hjärnan (meningit)

- krampanfall
- nackstelhet, huvudvärk
- feber, frossa, kräkningar
- ljuskänsliga ögon
- förvirring och sömnighet



Inflammation i nerverna

- smärta och svaghet och förlamning i armar och ben (Guillain-Barrés syndrom)



Inflammation i lederna

- smärta
- svullnad
- stelhet (immunmedierad artrit)



Inflammation i ögat

- ögonrodnad, ögonsmärta, ljuskänslighet och/eller förändringar i synen (uveit)



Lågt antal blodplättar

- blödning i näsa eller tandkött
- blåmärken



Lågt antal röda blodkroppar vid blodprov

- andfåddhet
- trötthet
- blek hud och/eller snabba hjärtslag

VANLIGA FRÅGOR

Nedan besvaras några frågor du kan tänkas ha gällande behandling med IMFINZI. Se till att du skriver ner eventuella ytterligare frågor du har, så att du kommer ihåg att ta upp dem med din läkare.

Vad ska min läkare känna till innan jag påbörjar behandling med IMFINZI?

Tala om för din läkare om:

- du har en autoimmun sjukdom (en sjukdom där kroppens immunsystem angriper sina egna celler)
- du har genomgått en organtransplantation
- du har lung- eller andningsproblem
- du har leverproblem

Hur länge kommer jag att behandlas med IMFINZI?

Din läkare bestämmer hur länge du kommer att behandlas med IMFINZI.

Finns det någon stödgrupp att vända sig till?

Lungcancerföreningen är en patientförening för patienter med lungcancer och deras anhöriga. Föreningen kan hjälpa dig och dina nära och kära att hantera och bättre förstå din sjukdom.

Rapportering av biverkningar

Det är inte alla som upplever biverkningar av behandling med IMFINZI, men om du gör det ska du prata med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i den här guiden eller i bipacksedeln.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

DITT VÅRDTEAM

I nedanstående fält skriver du ned kontaktinformationen för varje medlem i ditt vårdteam.

På så sätt har du all information du behöver på en lättillgänglig plats om du behöver kontakta någon.

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

VIKTIGA ANTECKNINGAR

Använd detta utrymme för att skriva ner eventuella tankar eller frågor du har till ditt vårdteam. Du kan också vilja skriva ned viktiga datum, till exempel dina nästa behandlingar, som en påminnelse.

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Vid kontakt med hälso- och sjukvården informera alltid att du står på denna behandling.
Läs noga igenom bipacksedeln innan du ges detta läkemedel.
Den innehåller information som är viktig för dig.

Se www.fass.se

AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje, Tel 08-553 260 00
www.astrazeneca.se

