



TILL DIG SOM HAR ORDINERATS **IMFINZI** FÖR **ICKE-SMÅCELLIG LUNGCANCER**

Denna broschyr är avsedd för dig som har ordinerats IMFINZI vid en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer.

Läs noga genom bipacksedeln innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. IMFINZI bipacksedel finns på www.fass.se.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OM LUNCANCER.....	4
Vad är icke-småcellig lungcancer (NSCLC)?.....	4
Vad betyder ”stadium III”?	4
VAD ÄR IMFINZI?	5
Vad IMFINZI används till	5
Hur du får IMFINZI	7
Förstå biverkningar	7
Vad gör jag om jag får en biverkning?	8
Eventuella biverkningar med IMFINZI	8
Tecken och symtom på eventuella allvarliga biverkningar	9
VANLIGA FRÅGOR.....	13
Vad ska min läkare känna till innan jag påbörjar behandling med IMFINZI?	13
Hur länge kommer jag att behandlas med IMFINZI?	13
Stödgrupp	13
DITT VÅRDTEAM	14
VIKTIGA ANTECKNINGAR	15

OM LUNGCANCER

Vad är icke-småcellig lungcancer?

Lungcancer inträffar när någon/några av cellerna i lungan går igenom en förändring som gör att de förökar sig utom kontroll så att de bildar en klump eller tumör.

Icke-småcellig lungcancer, även kallad NSCL, är den vanligaste typen av lungcancer och står för nästan 85 av 100 fall.

Vad betyder "stadium III"?

NSCLC kan diagnostiseras i stadium I, II III eller IV beroende av hur utbredd canceren är. "Stadium III" är en annan term för lokalt avancerad NSCLC. NSCLC i stadium III representerar en mycket skiftande sjukdom, så det är inte möjligt att rekommendera en "standardbehandling". För patienter i detta stadie, med en tumör som inte kan avlägsnas med operation, är ett behandlingsalternativ en kombination av cellgifts- och strålbehandling, följt av IMFINZI.

VAD ÄR IMFINZI?

Vad IMFINZI används till

IMFINZI är en immunterapi som fungerar genom att aktivera immunsystemet för att hjälpa till att känna igen och bekämpa tumörceller.

IMFINZI innehåller den aktiva substansen durvalumab som är en monoklonal antikropp, en typ av protein som är utformat för att känna igen en viss målsubstans i kroppen. I vissa fall kan aktivering av immunsystemet även påverka normala vävnader i kroppen, inte bara tumören. Detta kan leda till biverkningar av behandlingen, vilka är viktiga för dig att känna igen och genast rapportera till din läkare.

Biverkningar av immunterapi kan skilja sig från biverkningar som du kanske har upplevt vid tidigare behandlingar.

Din läkare har ordinerat IMFINZI eftersom hen har bedömt att det kommer att hjälpa till att behandla din typ av lungcancer.

Om du har frågar om hur IMFINZI verkar eller varför du har ordinerats detta läkemedel, fråga din läkare.

Graviditet

Detta läkemedel rekommenderas inte under graviditet.

Tala om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Om du är kvinna och skulle kunna bli gravid, måste du använda effektivt preventivmedel medan du behandlas med IMFINZI och i minst 3 månader efter din sista dos.

Amning

Tala om för läkaren om du ammar.

Fråga läkaren om du kan amma under eller efter behandling med IMFINZI.

Det är inte känt om IMFINZI går över i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att IMFINZI skulle påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du får biverkningar som påverkar din koncentrations- och reaktionsförmåga, bör du emellertid vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner.



Hur du får IMFINZI

IMFINZI ges som en infusion i en ven i armen en gång varannan vecka alternativt en gång var fjärde vecka. Varje infusion tar cirka en timme.

IMFINZI ges till dig på sjukhus eller på en mottagning under överinseende av en erfaren läkare. Din läkare kommer att bestämma hur många IMFINZI-behandlingar du behöver. IMFINZI behandlingen startar strax efter avslutad cellgifts- och strålbehandling.

Förstå biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan IMFINZI orsaka biverkningar, men alla kommer inte att få biverkningar från IMFINZI. Om du får biverkningar ska du prata med ditt vårdteam. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i den här broschyren eller i bipacksedeln. Du ska vara uppmärksam på biverkningar under och efter din behandling.

Här följer några tips som kan hjälpa dig att övervaka ditt hälsotillstånd:



Håll koll på hur du vanligtvis känner dig

Det är möjligt att du redan känner av symtom från din cancer, tidigare behandlingar eller andra läkemedel, så det är viktigt att skriva ned hur du känner dig före behandlingen. Detta kommer att hjälpa dig att lägga märke till eventuella förändringar.



Rapportera omedelbart biverkningar till din läkare

Om en biverkning identifieras tidigt kan den hanteras innan den blir allvarigare och möjligen orsakar att behandlingen stoppas. Be ditt vårdteam hjälpa dig att identifiera och rapportera eventuella biverkningar som du kanske har.



Samarbeta med din läkare

Det är viktigt att du låter ditt vårdteam få reda på eventuella biverkningar. Prata med dem om hur du känner dig just nu, om nya tecken på biverkningar eller någon annan förändring. Att få medicinsk behandling i tidigt skede kan förhindra att problemet blir allvarligt.

Vad gör jag om jag får en biverkning?

Om du får en biverkning, inklusive en som kanske inte nämns i denna broschyr eller i bipacksedeln, ska du genast kontakta ditt vårdteam. Det är lättare för ditt vårdteam att hantera biverkningar när de upptäckts tidigt.

Din läkare kan ge dig andra läkemedel för att förhindra allvarigare problem och för att hjälpa till att minska dina symtom. Eller så kanske din läkare bedömer att du ska vänta med eller hoppa över nästa dos av IMFINZI eller avsluta din behandling.

Eventuella biverkningar med IMFINZI

Precis som alla andra läkemedel kan IMFINZI orsaka biverkningar, men alla kommer inte att få biverkningar från IMFINZI. Om du får biverkningar ska du prata med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns nedan eller i bipacksedeln.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

- infektioner i övre luftvägarna
- underaktiv sköldkörtel vilket kan ge upphov till trötthet eller viktökning
- hosta
- diarré
- magsmärtor
- hudutslag eller klåda
- feber
- ledsmärta (atralgi)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- allvarliga lunginfektioner (pneumoni)
- svampinfektion i munnen
- infektion i tänder eller i mjukdelar i munnen
- influensaliknande sjukdom
- överaktiv sköldkörtel vilket kan ge upphov till hjärtklappning eller viktnedgång
- inflammation i lungorna (pneumonit)
- heshet (dysfoni)
- avvikande levertester (förhöjt aspartataminotransferas; förhöjt alaninaminotransferas)
- nattliga svettningar
- muskelsmärta (myalgi)
- avvikande njurfunktionstester (förhöjt blodkreatinin)
- smärta vid urinering (dysuri)
- svullnad i benen (perifert ödem)
- reaktion på infusion av läkemedlet vilket kan ge upphov till feber eller rodnad
- inflammation i levern vilket kan ge upphov till illamående eller minskad aptit

TECKEN OCH SYMTOM PÅ EVENTUELLA ALLVARLIGA BIVERKNINGAR

Vissa personer kan få biverkningar från behandling med immunterapi som påverkar olika delar av kroppen. Biverkningar av immunterapi kan skilja sig från biverkningar som du kanske har upplevt vid tidigare behandlingar. Dessa biverkningar kan ibland vara allvarliga, så det är viktigt att känna till dem. Denna information ersätter inte bipacksedeln, som innehåller information om andra möjliga biverkningar som inte nämns här.

Om du har något av nedanstående tillstånd måste du genast kontakta läkare.



Inflammation i lungorna

- ny eller förvärrad hosta
- andfåddhet
- bröstsmärta



Inflammation i levern

- illamående eller kräkningar
- minskad aptit
- smärta i högra sidan av magen
- gul hud eller gula ögonvitor
- dåsighet
- mörk urin
- får blödning eller blåmärken lättare än normalt



Inflammation i tarmar

- diarré eller fler tarmtömningar än vanligt
- avföring som är svart, tjärliknande eller klibbig med blod eller slem
- svår magsmärtor eller ömhet
- hål i tarmen



Inflammation i körtlar (särskilt sköldkörtel, binjurar, hypofys och bukspottkörtel)

- hjärtklappning
- extrem trötthet
- viktökning eller viktninskning
- yrsel eller svimning
- håravfall
- frusenhet
- förstoppning
- huvudvärk som inte går över eller onormal huvudvärk
- magsmärta, illamående och kräkningar



Typ 1-diabetes

- högt blodsocker
- ökad hunger eller törst
- urinerar oftare än vanligt
- snabb och djup andning
- förvirring
- söttaktigt luktande andedräkt
- en söt eller metallisk smak i munnen
- urin eller svett som luktar annorlunda



Inflammation i njurarna

- minskad mängd urin



Inflammation i huden

- utslag
- klåda
- blåsor i huden eller sår i munnen eller i andra fuktiga områden



Inflammation i hjärtmuskeln

- bröstsmärta
- andfåddhet
- oregelbundna hjärtslag



Inflammation i eller problem med musklerna

- muskelsmärta
- svaghet
- musklerna blir snabbt uttröttade



Inflammation i ryggmärgen (transversell myelit)

- smärta, domningar, stickningar eller svaghet i armar eller ben
- problem med urinblåsan eller tarmarna (däribland ett behov av att kissa oftare än vanligt, urininkontinens, svårigheter att kissa, förstoppning)



Infusionsrelaterade reaktioner

- frossa eller skakningar
- klåda eller utslag
- rodnande
- andfåddhet eller väsande andning
- yrsel
- feber



Inflammation i hjärnan (encefalit) eller i hinnorna runt ryggmärgen och hjärnan (meningit)

- krampanfall
- nackstelhet, huvudvärk
- feber, frossa, kräkningar
- ljuskänsliga ögon
- förvirring och sömnighet



Inflammation i nerverna

- smärta och svaghet och förlamning i armar och ben (Guillain-Barrés syndrom)



Inflammation i lederna

- smärta
- svullnad
- stelhet (immunmedierad artrit)



Inflammation i ögat

- ögonrodnad, ögonsmärta, ljuskänslighet och/eller förändringar i synen (uveit)



Lågt antal blodplättar

- blödning i näsa eller tandkött
- blåmärken



Lågt antal röda blodkroppar vid blodprov

- andfåddhet
- trötthet
- blek hud och/eller snabba hjärtslag

VANLIGA FRÅGOR

Följande lista besvarar några frågor om behandling med IMFINZI. Se till att du skriver ner eventuella ytterligare frågor du kan ha så att du kan ta upp dem med din läkare.

Vad ska min läkare känna till innan jag påbörjar behandling med IMFINZI?

Tala om för din läkare om:

- du har en autoimmun sjukdom (en sjukdom där kroppens immunsystem angriper sina egna celler)
- du har genomgått en organtransplantation
- du har lung- eller andningsproblem
- du har leverproblem

Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker) ska du prata med din läkare innan du får IMFINZI.

Hur länge kommer jag att behandlas med IMFINZI?

Din läkare bestämmer hur länge du kommer att behandlas med IMFINZI.

Stödgrupp

Lungcancerföreningen är en patientförening för patienter med lungcancer och deras anhöriga. Föreningen kan hjälpa dig och dina nära och kära att hantera och bättre förstå din sjukdom.

Rapportering av biverkningar

Inte alla kommer att uppleva biverkningar från IMFINZI, men om du gör det ska du prata med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i den här guiden eller i bipacksedeln.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

DITT VÅRDTEAM

I nedanstående fält skriver du ned kontaktinformationen för varje medlem i ditt vårdteam.

På så sätt har du all information du behöver på en lättillgänglig plats om du behöver kontakta någon.

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil.:	

VIKTIGA ANTECKNINGAR

Använd detta utrymme för att skriva ner eventuella tankar eller frågor du har till ditt vårdteam. Du kan också vilja skriva ned viktiga datum, till exempel dina nästa behandlingar, som en påminnelse.

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

IMFINZI® (durvalumab) 50 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning. IMFINZI används för att behandla en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna. Det används som enda läkemedel när din NSCLC: har spritt sig i lungan och inte kan avlägsnas med operation, och har svarat på eller stabiliserats efter inledande behandling med cellgift och strålning.

Det används i kombination med tremelimumab och cellgift när din NSCLC: har spritt sig i båda lungorna (och/eller till andra delar av kroppen) och inte kan avlägsnas med operation, och inte har visat ändringar (mutationer) i gener som kallas EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor) eller ALK (anaplastiskt lymfomkinas).

IMFINZI i kombination med cellgift används för att behandla en typ av lungcancer som kallas utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC) hos vuxna. Det används när din SCLC: har spridit sig i lungorna (eller till andra delar av kroppen) och inte har behandlats tidigare.

Varningsföreskrifter och begränsningar

Tala med läkare innan du ges IMFINZI om: du har en autoimmun sjukdom (en sjukdom där kroppens immunsystem angriper sina egna celler), du har genomgått en organtransplantation.

- du har lungproblem eller andningsproblem.
- du har leverproblem.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), bör du tala med läkaren innan du ges IMFINZI.

När du behandlas med IMFINZI kan du få vissa allvarliga biverkningar. Om det inträffar skall du omgående kontakta läkare. Mer information kring dessa, se bipacksedeln. Vid kontakt med hälso- och sjukvården informera alltid att du står på denna behandling.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du ges detta läkemedel.
Den innehåller information som är viktig för dig.

För övrig information se www.fass.se

AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje, Tel 08-553 260 00.
www.astrazeneca.se

