



TILL DIG SOM HAR ORDINERATS IMFINZI FÖR LUNGANCER

Denna broschyr är avsedd för dig som har ordinerats IMFINZI vid en typ av lungcancer som kallas icke småcellig lungcancer

**Läs noga genom bipacksedeln innan du ges detta läkemedel.
Den innehåller information som är viktig för dig.**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Om lungcancer.....	4
Vad är icke-småcellig lungcancer (NSCLC)?	4
Vad betyder "stadium III"?	4
Vad är IMFINZI?.....	5
Vad IMFINZI används till	5
Hur du får IMFINZI	6
Förstå biverkningar	7
Vad gör jag om jag får en biverkning?	8
Möjliga biverkningar med IMFINZI	9
Tecken och symtom på möjliga allvarliga biverkningar	10
Vanliga frågor och resurser.....	12
Vanliga frågor	12
Resurser och stödgrupper.....	13
Ditt vårdteam	14
Viktiga anteckningar	15

OM LUNGCANCER

VAD ÄR ICKE-SMÅCELLIG LUNGCANCER (NSCLC)?

Lungcancer inträffar när någon/några av cellerna i lungan går igenom en förändring som gör att de förökar sig utom kontroll så att de bildar en klump eller tumör.

Icke-småcellig lungcancer, även kallad NSCLC, är den vanligaste typen av lungcancer och står för nästan 85 av 100 fall.

VAD BETYDER "STADIUM III"?

NSCLC kan diagnostiseras i stadium I, II III eller IV beroende av hur utbredd cancer är. "Stadium III" är en annan term för lokalt avancerad NSCLC. NSCLC i stadium III representerar en mycket skiftande sjukdom, så det är inte möjligt att rekommendera en "standardbehandling". För patienter i detta stadie, med en tumör som inte kan avlägsnas med operation, är ett behandlingsalternativ en kombination av cellgifts- och strålbehandling, följt av IMFINZI.

VAD ÄR IMFINZI?

VAD IMFINZI ANVÄNDS TILL

IMFINZI är en immunterapi som fungerar genom att aktivera ditt immunsystem för att hjälpa till att känna igen och bekämpa tumörceller. IMFINZI innehåller den aktiva substansen durvalumab som är en monoklonal antikropp, en typ av protein som är utformat för att känna igen en viss målsubstans i kroppen. I vissa fall kan aktivering av immunsystemet även påverka normala vävnader i kroppen, inte bara tumören. Detta kan leda till biverkningar av behandlingen, vilka är viktiga för dig att känna igen och genast rapportera till din läkare. Biverkningar av immunterapi kan skilja sig från biverkningar som du kanske har upplevt vid tidigare behandlingar. Din läkare ordinerade IMFINZI eftersom hen har bedömt att det kommer att hjälpa till att behandla din typ av lungcancer. Om du har frågor om hur IMFINZI verkar eller varför du har ordinerats detta läkemedel, fråga din läkare.

VAD ÄR IMFINZI? (forts.)

HUR DU FÅR IMFINZI

IMFINZI ges som en infusion i en ven i armen en gång varannan vecka alternativt en gång var fjärde vecka. Varje infusion tar cirka en timme.

IMFINZI ges till dig på sjukhus eller på en mottagning under överinseende av en erfaren läkare. Din läkare kommer att bestämma hur många IMFINZI-behandlingar du behöver. IMFINZI behandlingen startar strax efter avslutad cellgifts- och strålbehandling.



Cirka en timmes infusion en
gång varannan vecka
alternativt var fjärde vecka



FÖRSTÅ BIVERKNINGAR

Precis som alla andra läkemedel kan IMFINZI orsaka biverkningar, men alla kommer inte att få biverkningar från IMFINZI. Om du får biverkningar ska du prata med ditt vårdteam. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i den här broschyren eller i bipacksedeln. Du ska vara uppmärksam på biverkningar under och efter din behandling.

Här följer några tips som kan hjälpa dig att övervaka ditt hälsotillstånd:



HÅLL KOLL PÅ HUR DU VANLIGTVIS KÄNNER DIG

Det är möjligt att du redan känner av symtom från din cancer, tidigare behandlingar eller till och med andra läkemedel, så det är viktigt att skriva ned hur du känner dig före behandlingen. Detta kommer att hjälpa dig att lägga märke till eventuella förändringar.



RAPPORTERA OMEDELBART BIVERKNINGAR TILL DIN LÄKARE

Om en biverkning identifieras tidigt kan den hanteras innan den blir allvarigare och möjligen orsakar att behandlingen stoppas. Be din vårdgivare hjälpa dig att identifiera och rapportera eventuella biverkningar som du kanske har.



SAMARBETA MED DIN LÄKARE

Det är viktigt att du låter ditt vårdteam få reda på eventuella förändringar i din kropp. Prata med dem om hur du känner dig just nu, om nya tecken på biverkningar eller någon annan förändring. Kom ihåg att en liten biverkning kan leda till något allvarigare om den inte behandlas.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Tala med läkare innan du ges IMFINZI om:

- du har en autoimmun sjukdom (en sjukdom där kroppens immunsystem angriper sina egna celler).
- du har genomgått en organtransplantation.

- du har lungproblem eller andningsproblem.
- du har leverproblem.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), bör du tala med läkaren innan du ges IMFINZI.

VAD ÄR IMFINZI? (forts.)

VAD GÖR JAG OM JAG FÅR EN BIVERKNING?

Om du får en biverkning, inklusive en som kanske inte nämns på nästa sida eller i bipacksedeln, ska du genast ringa eller besöka ditt vårdteam. Det är lättare för ditt vårdteam att hantera biverkningar när de upptäckts tidigt.

Din läkare kan ge dig andra läkemedel för att förhindra allvarigare problem och för att hjälpa till att minska dina symtom. Eller så kanske din läkare bedömer att du ska vänta med eller hoppa över nästa dos av IMFINZI eller avsluta din behandling.



Genom att rapportera eventuella biverkningar du upplever bidrar du till att öka informationen om våra läkemedels säkerhet. AstraZeneca övervakar säkerheten hos våra produkter genom att samla in, utvärdera och rapportera biverkningar från en mängd olika källor. Detta är en mycket viktig del i utvecklingen av förskrivningsinformationen som ger vårdpersonal den information om nytta/risk de behöver för att fatta lämpliga förskrivningsbeslut.



MÖJLIGA BIVERKNINGAR MED IMFINZI

Precis som alla andra läkemedel kan IMFINZI orsaka biverkningar, men alla kommer inte att få biverkningar från IMFINZI. Om du får biverkningar ska du prata med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns nedan eller i bipacksedeln.

MYCKET VANLIGA (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

- infektioner i övre luftvägarna
- underaktiv sköldkörtel vilket kan ge upphov till trötthet eller viktökning
- hosta
- diarré
- magsmärtor
- hudutslag eller klåda
- feber
- ledsmärta

VANLIGA (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

- allvarliga lunginfektioner (pneumoni)
- svampinfektion i munnen
- infektion i tänder eller i mjukdelar i munnen
- influensaliknande sjukdom
- överaktiv sköldkörtel vilket kan ge upphov till hjärklappning eller viktnedgång
- inflammation i lungorna (pneumonit)
- heshet (dysfoni)
- avvikande levertester (förhöjt aspartataminotransferas; förhöjt alaninaminotransferas)
- nattliga svettningar
- muskelsmärta (myalgi)
- avvikande njurfunktionstester (förhöjt blodkreatinin)
- smärta vid urinering
- svullnad i benen (perifer ödem)
- reaktion på infusion av läkemedlet vilket kan ge upphov till feber eller rodnad

TECKEN OCH SYMTOM

PÅ MÖJLIGA ALLVARLIGA BIVERKNINGAR

Vissa personer kan få biverkningar från behandling med immunterapi som påverkar olika delar av kroppen. Biverkningar av immunterapi kan skilja sig från biverkningar som du kanske har upplevt vid tidigare behandlingar. Dessa biverkningar kan ibland vara allvarliga, så det är viktigt att känna till dem. Denna information ersätter inte bipacksedeln, som innehåller information om andra möjliga biverkningar som inte nämns här.

Om du har något av nedanstående tillstånd måste du genast ringa till eller besöka läkare.

Symtomen kan innefatta:

Inflammation i
LUNGORNA



- Ny eller förvärrad hosta
- Andfåddhet
- Bröstmärta

Inflammation i
LEVERN



- Illamående eller kräkningar
- Minskning av aptiten
- Smärta på höger sida av magen
- Gulnande hud eller ögonvitor
- Dåsighet
- Mörk urin
- Får blödning eller blåmärken lättare än normalt

Inflammation i
TARMAR



- Diarré eller fler tarmtömningar än vanligt
- Svarta, tjärfärgade, klibbiga avföringar
- Avföring med blod eller slem
- Allvarlig smärta eller ömhet i magen

Inflammation i
KÖRTLAR
(SÄRSKILT SKÖLDKÖRTEL,
BINJURAR, HYPOFYS OCH
BUKSPOTTKÖRTEL)



- Hjärtklappning
- Extrem trötthet
- Viktökning eller viktnedgång
- Yrsel eller svimning
- Hårfall
- Frusenhet
- Förstoppning
- Huvudvärk som inte går över eller onormal huvudvärk, magsmärta, illamående och kräkningar.

TYP 1-DIABETES
(HÖGT BLODSOCKER)



- Högt blodsocker
- Ökad hunger eller törst
- Urinering oftare än vanligt
- Snabb och djup andning
- Förvirring
- Sötaktigt luktande andedräken
- En söt eller metallisk smak i munnen
- Urin eller svett som luktar annorlunda

Inflammation i
NJURARNA



- Minskad mängd urin

Inflammation i HUDEN		• Utslag • Klåda • Hudblåsor • Sår i munnen eller andra slemhinnor
Inflammation i HJÄRTMUSKELN		• Bröstmärta • Andfåddhet • Oregelbundna hjärtslag
Inflammation i MUSKLER		• Muskelsmärta • Muskelsvaghet
Inflammation i RYGGMÄRGEN		• Smärta, domningar, stickningar eller svaghet i armar och ben • Problem med urinblåsan eller tarmarna såsom behov av att kissa oftare, urininkontinens, svårighet att kissa och förstoppning
INFUSIONSRELATERADE REAKTIONER		• Frossa eller skakningar • Klåda eller utslag • Rodnande • Andfåddhet eller väsende andning • Yrsel • Feber
Inflammation i HJÄRNAN (encefalit) eller inflammation i hinnorna runt ryggmärgen och hjärnan (meningit)		• Krampanfall • Nackstelhet, huvudvärk • Feber, frossa, kräkningar • Ljuskänsliga ögon • Förvirring och sömnhighet
Inflammation i NERVERNA		• Smärta, svaghet, förlamning i armar och ben (Guillain-Barrés syndrom)
Lågt antal BLODPLÄTTAR		• Blödning • Blåmärken

RAPPORTERING AV BIVERKNINGAR

Inte alla kommer att uppleva biverkningar från IMFINZI, men om du gör det ska du prata med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i den här guiden eller i bipacksedeln.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läke-medelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läke-medels säkerhet.

VANLIGA FRÅGOR

Följande lista besvarar några frågor om behandling med IMFINZI. Se till att du skriver ner eventuella ytterligare frågor du kan ha så att du kan ta upp dem med din läkare.

Vad ska min läkare känna till innan jag påbörjar behandling med IMFINZI?

Tala om för din läkare om:

- du har en autoimmun sjukdom (en sjukdom där kroppens immunsystem angriper sina egna celler)
- du har genomgått en organtransplantation
- du har lung- eller andningsproblem
- du har leverproblem

Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker) ska du prata med din läkare innan du får IMFINZI.

Hur länge kommer jag att behandlas med IMFINZI?

Din läkare bestämmer hur länge du kommer att behandlas med IMFINZI.



STÖDGRUPP

Lungcancerföreningen är en patientförening för patienter med lungcancer och deras anhöriga. Föreningen kan hjälpa dig och dina nära och kära att hantera och bättre förstå din sjukdom.



Lungcancerföreningen
www.lungcancerforeningen.se
Telefon: 020-88 55 33
E-mail: info@lungcancerforeningen.se

DITT VÅRDTEAM

I nedanstående fält skriver du ned kontaktinformationen för varje medlem i ditt vårdteam. På så sätt har du all information du behöver på en lättillgänglig plats om du behöver ringa någon.

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil:	E-post:

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil:	E-post:

Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil:	E-post:


Namn:	Specialitet:
Adress:	
Mobil:	E-post:

VIKTIGA ANTECKNINGAR (forts.)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines. The lines are arranged in pairs, with a light gray background for the first line of each pair and a white background for the second line of each pair.




VIKTIGA ANTECKNINGAR (forts.)

[illegible]



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines. The lines are arranged in pairs of a solid blue line, a dashed blue line, and a solid blue line, providing a guide for letter height and placement.



Imfinzi® (durvalumab) 50 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning. IMFINZI används för att behandla en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna. Det används som enda läkemedel när din NSCLC: har spritt sig i lungan och inte kan avlägsnas med operation, och har svarat på eller stabiliserats efter inledande behandling med cellgift och strålning.

Det används i kombination med tremelimumab och cellgift när din NSCLC: har spritt sig i båda lungorna (och/eller till andra delar av kroppen) och inte kan avlägsnas med operation, och inte har visat ändringar (mutationer) i gener som kallas EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor) eller ALK (anaplastiskt lymfomkinas).

IMFINZI i kombination med cellgift används för att behandla en typ av lungcancer som kallas utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC) hos vuxna. Det används när din SCLC: har spridit sig i lungorna (eller till andra delar av kroppen) och inte har behandlats tidigare.

Varningsföreskrifter och begränsningar: När du behandlas med IMFINZI kan du få vissa allvarliga biverkningar. Om det inträffar skall du omgående kontakta läkare. Mer information kring dessa, se bipacksedeln. Vid kontakt med hälso- och sjukvården informera alltid att du står på denna behandling.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

För övrig information se www.fass.se

SE-16372-04-24-ONC